

Les lactaires

Caractères communs

Chair cassante comme la craie

Lait présent (aqueux, blanc, jaunissant, violaçant, verdissant)

Chapeau + ou - déprimé (ombiliqué, en coupe, en entonnoir)

Lames arquées à + ou - décurrentes, jamais libres

Sporée crème + ou - foncé

Pas de couleurs très vives

Tous les lactaires sont mycorhiziques

Environ 150 espèces en Europe. Une quarantaine est présentée ici.

1- lait blanc immuable

vellereus = **Lactifluus vellereus** (lactaire velouté) – chapeau jusqu'à 20-25 cm de diamètre, sec, velouté, blanc à blanchâtre, chair âcre, sous feuillus : chênes, hêtres

piperatus = **Lactifluus piperatus** (lactaire poivré) – chapeau jusqu'à 10 cm de diamètre, sec, mat, blanc, lames très serrées et très étroites (1-2 mm de large) saveur piquante, précoce, sous feuillus

pallidus (lactaire pâle) – chapeau jusqu'à 8-10cm de diamètre, blanchâtre à crème grisâtre, saveur un peu piquante, sous hêtres en terrain calcaire

zonarius (lactaire zoné) – chapeau jusqu'à 12 cm de diamètre, jaune à ochracé, nettement zoné, lames crème, saveur piquante, sous chênes en terrain calcaire

rufus (lactaire roux) – chapeau jusqu'à 12 cm de diamètre, avec un petit mamelon dans la dépression, brun roux, fort contraste avec les lames blanchâtres, chair très âcre, conifères, épicéas surtout

hysginus (lactaire cireux) – chapeau jusqu'à 8-10 cm de diamètre, visqueux, brun rougeâtre assez sombre, un peu zoné, saveur très piquante, sous épicéas

torminosus (lactaire à toison, lactaire à coliques) – chapeau jusqu'à 12 cm de diamètre, velu barbu, rosâtre orangé à saumoné avec des zones concentriques, lames blanchâtres à crème, pied plus pâle, saveur piquante, toxique

2- lait blanc jaunissant + ou –

badiosanguineus (lactaire bai sanguin) – chapeau jusqu'à 6-7 cm de diamètre, brun rouge, brun pourpre à brun noirâtre, odeur un peu fruitée, saveur presque douce, lait jaunissant faiblement sur un mouchoir, sous épicéas, sapins, plutôt en terrain calcaire

hepaticus (lactaire couleur de foie) – chapeau jusqu'à 6 cm de diamètre, brun châtain à brun sépia terne, lames crème, pied un peu plus clair que le chapeau et tomenteux à la base, lait blanc jaunissant lentement, saveur piquante, sous les pins

sphagneti (lactaire des sphaignes) – chapeau jusqu'à 6 cm de diamètre, souvent avec un petit mamelon, brun rougeâtre plus sombre au centre, lames crème, saveur douce, lait blanc jaunissant lentement sur un mouchoir, sous épicéas, dans ou près des sphaignes

tabidus (lactaire liquéfié) – chapeau jusqu'à 5-6 cm de diamètre, souvent avec un petit mamelon et + ou – ridé, jaune ochracé à brun orangé clair, lames crème, lait peu abondant jaunissant rapidement sur un mouchoir, saveur un peu piquante, sous bouleaux, dans ou près des tourbières

lacunarum (lactaire des fossés) – chapeau jusqu'à 7 cm de diamètre, avec un petit mamelon au départ, brun jaune à brun orangé, lames crème, pied concolore au chapeau plus sombre en bas, lait blanc jaunissant lentement sur un mouchoir, légèrement âcre, sous feuillus en zone humide, dans les fossés.

britannicus=subsericatus (lactaire soyeux) – chapeau jusqu'à 7-8 cm de diamètre, roux orangé à brun orangé avec le bord plus clair, lames crème ochracé clair, pied plus clair que le chapeau, saveur douce puis un peu piquante, odeur faible de caoutchouc, lait jaunissant lentement sur un mouchoir, sous hêtres ou d'autres feuillus

intermedius (lactaire intermédiaire) – chapeau jusqu'à 18-20 cm de diamètre, jaune assez pâle, presque non zoné, lames blanches à reflets carnés, pied plus clair avec de petites fossettes (scrobicules) lait blanc rapidement jaune vif, sous sapins uniquement et sol calcaire

scrobiculatus (lactaire à fossettes) – chapeau jusqu'à 20-25 cm de diamètre, ochracé jaunâtre à brun jaune, assez nettement zoné, lames crème, pied avec des fossettes, lait blanc rapidement jaune vif, saveur piquante, sous épicéas seulement et terrain calcaire

chrysorrhoeus (lactaire à lait doré) – chapeau jusqu'à 6-8 cm de diamètre, jaune rosé à brun rosé, zoné, avec des fossettes, pied et lames blanchâtres, lait blanc puis jaune citron, saveur piquante, sous chênes

3- lait blanc violaçant

aspideus (lactaire en bouclier) – chapeau jusqu'à 6 cm de diamètre, blanc jaunâtre, lames et pied blanchâtres, lait blanc violaçant assez rapidement, saveur amère, uniquement sous les saules

repraesentaneus (lactaire spectaculaire) – chapeau jusqu'à 15 cm de diamètre, jaune assez vif, barbu à la marge, pied concolore ou plus pâle avec des fossettes, lames crème clair, saveur un peu amère, lait blanc devenant violacé, sous épicéas et bouleaux, souvent près des cours d'eau

flavidus (lactaire jaunâtre) – chapeau jusqu'à 8 cm de diamètre, crème à jaune pâle, pied concolore, lames crème, saveur piquante, lait blanc séchant en violet sur les lames, sous chênes et charmes en terrain calcaire

uvidus (lactaire humide) – chapeau jusqu'à 6-7 cm de diamètre, visqueux, non zoné, gris lilacin, pied concolore, lames crème, saveur un peu amère, lait blanc violaçant, sous bouleaux, épicéas et souvent dans ou près des sphaignes

4- lait blanc rosissant + ou – rapidement

acris (lactaire âcre) – chapeau jusqu'à 7-8 cm de diamètre, un peu visqueux, crème à ochracé fuligineux clair, pied blanchâtre, saveur piquante, lait blanc très rapidement rosé, sous hêtres, terrain calcaire

azonites (lactaire à pied blanc) – chapeau jusqu'à 7-8 cm de diamètre, gris brun à café au lait clair, pied blanc, lames blanches puis crème, lait blanc rosissant lentement, saveur un peu piquante, sous feuillus, surtout chênes

pterosporus (lactaire à spore ailée) – chapeau jusqu'à 8 cm de diamètre, mat, velouté, + ou – ridé, café au lait, lames crème ochracé, pied plus clair, saveur piquante, lait blanc rosissant lentement, surtout sous hêtres en terrain calcaire. Spores fortement ailées

lignyotus (lactaire couleur de suie) – chapeau jusqu'à 7-8 cm de diamètre, avec un petit mamelon, brun noirâtre, pied un peu plus clair nettement strié à l'insertion des lames, lames blanches, chair rosissant lentement et faiblement, lait blanc à peine rosissant, sous épicéas en montagne

picinus (lactaire couleur de poix) – chapeau jusqu'à 8-9 cm de diamètre, brun sombre, bombé puis plan, peu déprimé, lames blanchâtres à crème, chair rosissant faiblement, lait blanc rosissant lentement sur les lames, saveur un peu amère, sous épicéas en montagne

5- lait orangé rougeâtre

deliciosus (lactaire délicieux) – chapeau jusqu'à 12-15 cm de diamètre, brun orangé, un peu zoné, verdissant un peu, pied assez court avec des fossettes, lait et chair carotte, sous pins uniquement

deterimus (lactaire très mauvais) – chapeau jusqu'à 12 cm de diamètre, un peu zoné, orange puis verdissant, lames et pied orangé clair, pied souvent cerné de blanc au sommet, chair orangée verdissante, saveur désagréable, seulement sous épicéas

salmonicolor (lactaire saumon) – chapeau jusqu'à 12-15 cm de diamètre, peu zoné, orangé, non ou peu verdissant, lames orangé saumoné, lait carotte peu abondant, saveur désagréable, uniquement sous sapins

6- lait blanc devenant gris olivâtre

blennius (lactaire muqueux) – chapeau jusqu'à 8 cm de diamètre, un peu visqueux, gris brun à gris verdâtre et nuances violacées avec quelques fossettes, lames blanchâtres à crème, pied un peu plus clair que le chapeau, lait blanc séchant en gris olivâtre, saveur piquante, sous hêtres seulement

fluens (lactaire coulant) – chapeau jusqu'à 10 cm de diamètre, gris brun à gris vert sans nuances violacées, lames blanchâtres à crème, lait blanc très abondant séchant en gris olivâtre, saveur piquante, sous hêtres

albocarneus (lactaire glutineux) – chapeau jusqu'à 7 cm de diamètre, beige à ochracé, parfois à reflets violacés, très visqueux, pied visqueux blanchâtre, lames blanches à crème, lait blanc séchant lentement en gris olivâtre, sous sapins, épicéas, plutôt en terrain calcaire

vietus (lactaire fané) – chapeau jusqu'à 6-7 cm de diamètre, gris brun à gris violacé palissant en séchant, lames blanches à crème, lait blanc séchant en gris olivâtre, saveur piquante, sous bouleaux, dans ou près des tourbières

trivialis (lactaire commun) – chapeau jusqu'à 12-15 cm de diamètre, gris violacé assez sombre avec des fossettes, beige ochracé en vieillissant et devenant méconnaissable, lames crème, pied creux gris pâle, lait blanc séchant lentement en olivâtre et jaune orangé avec KOH, saveur piquante, sous bouleaux et épicéas, terrain humide non calcaire

circellatus (lactaire cerclé) – chapeau jusqu'à 9-10 cm de diamètre, gris cendré à gris brunâtre, typiquement zoné avec quelques fossettes, lames beige ochracé, pied plus pâle, lait presque immuable lentement gris jaune, saveur piquante, sous charmes

necator = **plumbeus** (lactaire meurtrier) – chapeau jusqu'à 12-15 cm de diamètre, brun olivâtre à brun noir, jaune olivâtre au bord, lames blanchâtres, pied concolore au chapeau ou plus clair, lait blanc séchant en olivâtre et violet par KOH, saveur très piquante, sous bouleaux et épicéas.

Contient une substance cancérigène

7- espèces à odeur forte

camphoratus (lactaire camphré) – chapeau jusqu'à 6 cm de diamètre, vite mat et velouté, brun pourpre, pied à base vineux violacé, lait peu abondant aqueux, odeur de chicorée plus forte en séchant, saveur douce, feuillus et conifères sur terrain non calcaire

glyciosmus (lactaire à odeur suave) – chapeau jusqu'à 6 cm de diamètre, fragile, gris lilas, gris beige en séchant, lait blanc peu abondant, odeur de gâteau à la noix de coco, saveur faiblement piquante, sous les bouleaux souvent avec sphaignes

helvus (lactaire brun jaune) – chapeau jusqu'à 12 cm de diamètre, sec, mat, brun lilacin à brun orangé, peu zoné, avec parfois quelques fossettes, odeur forte de céleri, saveur douce, lait aqueux peu abondant, sous pins, épicéas, bouleaux, dans les sphaignes.

quietus (lactaire tranquille)– chapeau jusqu'à 8 cm de diamètre, sec, brun rougeâtre, souvent zoné avec quelques fossettes, lait blanc jaunissant faiblement et lentement, odeur dite de punaise, saveur désagréable, sous les chênes